

ДЭЛХИЙ ДАХИНД БҮДҮҮН ШУЛУУН ГЭДЭСНИЙ ХОРТ ХАВДРЫН ӨВЧЛӨЛ, НАС БАРАЛТЫН БАЙДАЛ




1.1 Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар:


Монгол улс бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын өвчлөлийн түвшингээр дэлхийн 185 орноос 130-рт эрэмбэлэгдэж дэлхийн дунджаас 3 дахин бага байна (Зураг 13).

Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын нас баралтын түвшингээр дэлхийн 185 орноос 154-рт эрэмбэлэгдэж дэлхий, Ази номхон далайн баруун бүсийн орнууд, зүүн азийн орнуудын дунджаас 2 дахин бага байна (Зураг 14).

Зураг 13. Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын өвчлөлийн стандартчилсан түвшин, харьцуулалт



Зураг 14. Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын нас баралтын стандартчилсан түвшин, харьцуулалт



2.5.1 Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар




Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын 413 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэний 206(50%) эрэгтэй, 207(50%) эмэгтэйчүүд өвчилжээ. Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын өвчлөл 100 000 хүн амд 12.1 тохиолдол, эрэгтэй хүйсийн 100 000 хүн амд 12.2 тохиолдол, эмэгтэй хүйсийн 100 000 хүн амд 11.9 тохиолдол байна. 2024 оны байдлаар 67 хүн тутмын 1, 53 эрэгтэй тутмын 1 нь, 77 эмэгтэй тутмын 1 нь бүдүүн шулуун гэдэсний хавдарт өртөх эрсдэлтэй байна (Хавсралт 10). 2024 онд бүдүүн шулуун гэдэсний хавдарт өртсөн дундаж насны хувьд эрэгтэйчүүдэд 58, эмэгтэйчүүдэд 61 нас байна (Хавсралт 31).

Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын тархалтыг Монгол улсын газар зүйн бүс нутгаар харьцуулан үзэхэд Говь, Баруун, Хангайн, бүсийн аймгуудад улсын дунджаас бага, Хойд, Зүүн, Төвийн бүс ба Улаанбаатар хотод өвчлөл өндөр байжээ (Хавсралт 10). Аймгуудаас 100 000 хүн амд харьцуулсан үзүүлэлтээр Булган 23.2 тохиолдол, Сэлэнгэ 18.9 тохиолдол, Дорноговь 16.7 тохиолдлуудаар тэргүүлж байгаа ба Дорнод, Хөвсгөл, Төв, Өвөрхангай, Завхан, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Увс, Дундговь, Архангай, Ховд, Өмнөговь аймгуудад улсын дунджаас бага тохиолдож байна (Зураг 31).

Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын өвчлөлийг хүйсээр харьцуулбал эрэгтэйчүүдэд тохиолдож буй бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын өвчлөл Төвийн, Хойд бүс, Улаанбаатар хотод улсын дунджаас өндөр, эмэгтэйчүүдэд тохиолдож буй бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын өвчлөл Зүүн, Хойд бүс, Улаанбаатар хотод улсын дунджаас өндөр байна (Зураг 31).

Зураг 31. Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын өвчлөлийн түвшин, 100000 хүн амд, аймаг бүсээр




Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын шалтгаант нас баралт

3.4.5 Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар

Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын шалтгаант нас баралтын 196 тохиолдол бүртгэгдсэний 99(51%) эрэгтэй, 97(49%) эмэгтэйчүүд өвчилжээ. Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын нас баралт 100 000 хүн амд 5.7 тохиолдол, эрэгтэй хүйсийн 100 000 хүн амд 5.9 тохиолдол, эмэгтэй хүйсийн 100 000 хүн амд 5.6 тохиолдол байна. Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын шалтгаант нас баралтыг Монгол улсын газар зүйн бүс нутгаар харьцуулан үзэхэд Баруун, Хангай, Говийн бүсэд улсын дунджаас бага, бусад бүс, Улаанбаатар хотод улсын дунджаас өндөр байна (Хавсралт 24) Аймгуудаас 100 000 хүн амд харьцуулсан үзүүлэлтээр Сэлэнгэ 12.3 тохиолдол, Дархан-Уул 9.6 тохиолдол, Дорнод 8.3 тохиолдлуудаар тэргүүлж байна (Зураг 43).

Зураг 43. Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын нас баралтын түвшин, 100000 эмэгтэй хүн амд, аймаг бүсээр



Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдрын нас баралтыг хүйсээр харьцуулбал эрэгтэйчүүдэд тохиолдож буй бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын нас баралт Зүүн, Төвийн бүс, Улаанбаатар хотод улсын дунджаас өндөр, эмэгтэйчүүдэд тохиолдож буй бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын нас баралт Зүүн, Төвийн, Хойд бүс Улаанбаатар хотод улсын дунджаас өндөр байна (Зураг 43).

